

## Umgang mit COVID-19-verdächtiger Symptomatik in Kitas und Schulen

### 1 Reihentestungen asymptomatischer Kinder/SuS/Betreuungspersonal in Kitas und Schulen

- Die Reihentestung asymptomatischer Kinder in den Kitas und der SuS in Schulen wird ab sofort ausgesetzt. Dieses gilt auch für das betreuende Personal in Kitas und Schulen.
- Damit wird neben dem Kontaktpersonenmanagement in Kitas und Schulen auch das Fließschema „Handlungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratorischer Symptomatik (ARE) außer Kraft gesetzt.

### 2 Testung symptomatischer Kinder/SuS/Betreuungspersonal in Kitas und Schulen

- Symptomatische Kinder/SuS/Betreuungspersonal testen sich mittels Antigentest\* vor Betreten der Einrichtung in der Häuslichkeit:  
**verpflichtend** für Schulen \*\*  
**dringende Empfehlung** für Kitas
- bei anhaltender Symptomatik Wiederholung des Antigentests alle zwei Tage
- Bei negativem Antigentest\* ist das Betreten der Einrichtung erlaubt.
- Bei positivem Antigentest\* muss das Antigentestergebnis mittels PCR-Test bestätigt werden (direkt in einem Abstrichzentrum oder bei erforderlicher Arztkonsultation über den Haus-/ Kinderarzt).
  - Bei **negativem** PCR-Test ist das Betreten der Einrichtung erlaubt.
  - Bei **positivem** PCR-Test ist die häusliche Isolation erforderlich.
    - Die Isolation endet frühestens nach Ablauf von 5 Tagen, sofern zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit bestand (Tag der PCR-Abstrichnahme = Tag 0).
    - dringende Empfehlung: Ab Tag 6 tägliche Ag-Selbsttestung – bei positivem Testergebnis fortgesetzte Selbstisolation bis zum negativen Testergebnis
    - Die Isolation dauert maximal 10 Tage.

### 3. Hinweis für Kontaktpersonen

- Besuch der Einrichtung ist bei Symptomfreiheit möglich.
- dringende Empfehlung zur Kontaktreduzierung, vor allem mit Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf
- dringende Empfehlung zur Symptombeobachtung und täglichen (Selbst-)Testung mit Antigen-Schnelltests\* für 5 Tage

\* Antigentest, PEI-gelistet mit hinreichender Sensitivität <https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf>

\*\* Durchführung in der Häuslichkeit mit Selbsterklärung der Eltern bzw. der MitarbeiterInnen möglich

Quellen:  
- Robert-Koch-Institut (Empfehlungen zu Isolierung und Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektion und -Exposition, Stand 2.5.2022)  
- Corona-LVO M-V vom 31.3.2022 (zuletzt geändert: 5.5.2022); 2. Corona-KiföVO ÄndVO M-V (12.5.2022), 2. ÄndVO der 6. SchulCoronaVO M-V (12.5.2022)